



Scheda tecnica prodotto

**Nome: REPELT - COLLARE
ANTIPARASSITARIO CANI GRANDE TAGLIA**

**Codice prodotto: 00042
EAN: 8007229000424**

Contenuto: 1 pz

PER USO VETERINARIO

**Pz. per cartone: 12
Pz. per strato: 336**

Misure pack: 13 x 2,3 x 12h cm

Repelt - Collare antiparassitario cani grande taglia: con il principio attivo del Diazinone per il trattamento delle infestazioni da zecche e pulci nei cani di taglia grande. Efficace per 4 mesi. Per cani con peso sopra i 25 kg.

Composizione:
Principio attivo: diazinone 15% (6,15 g per collare) - Eccipienti: qb a 100 gr

Posologia: 1 collare per 4 mesi

Modalità di utilizzo : uso esterno. Attaccare il collare attorno al collo dell'animale e regolarlo. Tagliare la parte in eccedenza, tenendo conto della prevista crescita dell'animale.

Speciali precauzioni per la conservazione: aprire il contenitore solo prima dell'utilizzo. Conservare nell'imballaggio di origine a temperatura inferiore a 25°C. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Modalità di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Controindicazioni: da non utilizzare sugli animali malati o convalescenti né su animali con estese lesioni della pelle. Da non utilizzare sui cuccioli di meno di 3 mesi.

Avvertenze speciali: togliere il collare ai primi segni di irritazione cutanea.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: da non utilizzarsi contemporaneamente ad altri insetticidi e nei 14 giorni successivi all'asportazione. Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di togliere il collare ai segni di irritazione cutanea o di reazioni avverse. E necessario un controllo continuativo dell'integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza a contatto con l'animale.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Uso veterinario – uso esterno – da non ingerire.

Reazioni avverse: può comparire una debole irritazione cutanea dovuta allo sfregamento del collare. Si consiglia di rimuovere il collare fino alla scomparsa dei sintomi.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento: non usare durante la gravidanza. Non usare durante l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: da non utilizzare contemporaneamente ad altri inibitori della colinesterasi (per esempio organofosforati, carbamati...).

Sovradosaggio: non superare le dosi consigliate. In caso di ingestione o di masticazione, consultare immediatamente un veterinario, se possibile mostragli l'etichetta.

Sintomi: Ipersalivazione, tremori, ipereccitabilità. **Antidoto:** atropina.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo: i confezionamenti vuoti e tutti i residui del prodotto devono essere eliminati secondo le disposizioni di legge sui rifiuti. Il prodotto utilizzato o no deve essere conferito negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati. Non contaminare corsi d'acqua, stagni o il terreno.